

Biologische Messungen: Bestimmungsschlüssel

Benutzung des Bestimmungsschlüssels

Der Bestimmungsschlüssel ist so aufgebaut, dass immer zwischen zwei ausgezogenen Linien ein Entscheidungspunkt ist. Betrachte das zu bestimmende Tier. Je nachdem, welche Beschreibung zutrifft, musst du an einer anderen Stelle im Bestimmungsschlüssel weitermachen.

Beispiel:

Das zu bestimmende Tier hat ganz kleine Stummelfüsschen.

1	Tier ohne Beine	weiter bei 2
1*	Tier mit deutlich ausgebildeten Beinen oder Stummelfüsschen	weiter bei 7

Gemäss dem ersten Entscheidungspunkt musst du weitermachen mit dem Entscheidungspunkt 7.

7	ohne gegliederte Beine, scheinbar beinlos; höchstens Stummelfüsschen oder Kriechwülste; madenartig; oft Körperanhänge	Larven von Mücken, Schnaken	 Zuckmückenlarve  Ibismückenlarve
7*	Körper mit gegliederten Beinen	weiter bei 8	 Schnakenlarve  Kriebelmückenlarve

Da dein Tier keine gegliederten Beine hat, sondern nur ungegliederte Stummelfüsschen, ist die Bestimmung zu Ende: Es handelt sich um eine Larve einer Mückenart.

Tipp Mach aussagekräftige Fotos der Tiere. Diese Fotos kannst du dann im Bericht verwenden.

Bestimmungsschlüssel

1 Tier ohne Beine **weiter bei 2**

1* Tier mit deutlich ausgebildeten Beinen oder Stummelfüsschen **weiter bei 7**

2 Tier eingeschlossen in einer Schale oder in einem Köcher **weiter bei 3**

2* Tier ohne Schale oder Köcher **weiter bei 5**

3 röhrenförmiger Köcher aus Sand, Steinchen oder Pflanzenteilen **weiter bei 16**

3* zweiteilige Schale oder gewundenes, beziehungsweise mützenförmiges Gehäuse **weiter bei 4**

4 Schale aus 2 Klappen, höchstens erbsengross **Muscheln**



Erbsenmuschel

4* Schale wie eine Spirale oder Mütze **Süsswasserschnecken**



Spitzschlamm Schnecke



Posthornschnecke



Flussnapfschnecke

5 Körper ungegliedert, abgeplattet; Hinterende zugespitzt; Vorderende mit kleinen Augen durch leichte Einschnürungen (siehe Pfeile) abgegrenzt **Strudelwürmer (Plattwürmer)**



5* Körper äusserlich geringelt, wurmartig **weiter bei 6**

6 Vorder- und Hinterende mit Saugnapf (siehe Pfeile); Fortbewegung mithilfe der Saugnapfe oder schlängelnd **Egel**



Rollegel



Schneckenegel

6* Vorder- und Hinterende ohne Saugnapf; Körper ohne Beine, geringelt, Tier sieht regenwurmartig aus oder Tier ist fadenförmig, rötlich und lang **Rundwürmer**



Schlammröhrenwurm



Vierkantwurm

- 7** ohne gegliederte Beine, scheinbar beinlos; höchstens Stummelfüsschen oder Kriechwülste; madenartig; oft Körperanhänge

Larven von Mücken, Schnaken



Zuckmückenlarve



Ibismückenlarve



Schnakenlarve



Kriebelmückenlarve

- 7*** Körper mit gegliederten Beinen

weiter bei 8

- 8** mehr als 3 Beinpaare

weiter bei 9

- 8*** höchstens 3 Beinpaare

weiter bei 12

- 9** Tiere mit 8 Beinen; Körper kugelig, oft auffallend gefärbt, z. B. rot; Tier sehr klein, bewegt sich sehr schnell

Wassermilben




- 9*** Tiere mit mehr als 8 Beinen

weiter bei 10

- 10** vorderes Beinpaar als Krebsschere ausgebildet

Flusskrebse



- 10*** ohne Krebsscheren

weiter bei 11


- 11** Körper seitlich zusammengedrückt, deutlich höher als breit; Tier liegt auf der Seite.

Bachflohkrebse



- 11*** Körper nicht seitlich zusammengedrückt; Tier läuft auf seinen Beinen

Wasserasseln




- 12** Tier mit harten Vorderflügeln, die wie ein Deckel den Hinterleib bedecken

Wasserkäfer



Hakenkäfer




Schwimmkäfer

- 12*** anders

weiter bei 13

- 13** Komplexaugen (siehe Pfeil); ältere Larven mit äusserlich sichtbaren Flügelanlagen (siehe Pfeil)

weiter bei 14




- 13*** Augen in Form von einfachen Punktaugen (siehe Pfeil); ältere Larven ohne äusserlich sichtbare Flügelanlagen

weiter bei 16



- 14** 3 nicht unterteilte, flache und am Ende abgerundete Schwanzanhänge (siehe Pfeil): Larve einer Kleinlibelle; sehr kurze, stachelförmige Schwanzanhänge: Larve einer Grosslibelle

**Larven
von Libellen**




- 14*** 2 bis 3 lange, gegliederte und spitze Schwanzanhänge

weiter bei 15

- 15** Hinterleib mit seitlichen büschel- oder blättchenförmigen Kiemen (siehe Pfeil); meist mit 3 Schwanzanhängen

**Larven
von Eintagsfliegen**




- 15*** Hinterleib ohne seitliche Kiemen; immer 2 Schwanzanhänge (siehe Pfeil); bewegen sich schlängelnd

**Larven
von Steinfliegen**



- 16** Tiere mit oder ohne Köcher; am Hinterleibsende 2 beinartige Anhänge mit Klauen (siehe Pfeil)

**Larven
von Köcherfliegen**




- 16*** Hinterleibsende ohne solche Anhänge

weiter bei 17

- 17** Hinterleib seitlich mit *gegliederten* Kiemen; behaarter, fadenförmiger Anhang am Hinterleibsende (siehe Pfeil)

**Larven
von Schlammfliegen**



- 17*** Hinterleib ohne oder (selten!) mit *ungegliederten* Kiemen-anhängen

**Larven
von Wasserkäfern**

